



COVID-19疫苗介紹

	莫德納 BA.1雙價 (O/O BA.1)	莫德納		BNT			Novavax	高端	AZ (國內已無庫存)
		成人劑型	幼兒劑型	成人劑型	兒童劑型	幼兒劑型			
外觀									
包裝	多劑型。 5劑/瓶 · 10瓶/盒	多劑型。 10劑/瓶 · 10瓶/盒	多劑型。 10劑/瓶 · 10瓶/盒	多劑型。 6劑/瓶 · 49瓶/盒	多劑型。 10劑/瓶 · 10瓶/盒	多劑型。 10劑/瓶 · 10瓶/盒	多劑型。 10劑/瓶 · 10瓶/盒	1. 單劑型 2. 多劑型 · 10劑/瓶 · 10瓶/盒	多劑型。 10劑/瓶 · 10瓶/盒
稀釋	X	X	X	O (+1.8mL)	O (+1.3mL)	O (+2.2mL)	X	X	X
開瓶時間	2~25°C 12-19小時	2~25°C 12-19小時	2~25°C 12-19小時	2°C~30°C 6小時內	2°C~30°C 12小時內	2°C~30°C 12小時內	2°C~25°C 6小時內	6小時	6小時
劑量	0.5 mL/劑 (25微克原始株+ 25微克Omicron BA.1)	0.5 mL/劑 (100微克)	0.25 mL/劑 (25微克)	0.3 mL/劑 (30微克)	0.2 mL/劑 (10微克)	0.2 mL/劑 (3微克)	0.5 mL/劑 (5微克)	0.5 mL/劑 (15微克)	0.5 mL/劑 (5*10 ¹⁰ viral particle)
年齡 劑次	12-17歲 第3劑(追一) 第4劑(追二) 18歲以上 第3劑(追一) 第4劑(追二) 第5劑(追三)	6-11歲 第1.2劑(半劑) 12-17歲 第1.2劑 基礎加強劑 18歲以上 第1.2劑 基礎加強劑 第3劑(追一)(半劑) 第4劑(追二)(半劑) 第5劑(追三)(半劑)	6個月-5歲 第1.2劑	12歲-17歲 第1.2劑 基礎加強劑 第3劑(追一) 第4劑(追二) 18歲以上 第1.2劑 基礎加強劑 第3劑(追一) 第4劑(追二) 第5劑(追三)	5-11歲 第1.2劑 基礎第3劑(1.2劑接 種幼兒BNT者) 基礎加強劑	6個月至4歲 第1.2.3基礎劑	12-17歲 第1.2劑 第3劑(追一) 第4劑(追二) 18歲以上 第1.2劑 基礎加強劑 第3劑(追一) 第4劑(追二) 第5劑(追三)	20歲以上 第1.2劑 基礎加強劑 第3劑(追一) 第4劑(追二) 第5劑(追三)	18歲以上 第1.2劑 基礎加強劑 第3劑(追一)(不建議)

註：追一(第一次追加劑)、追二(第二次追加劑)、追三(第三次追加劑)



COVID-19疫苗開放對象及接種方式

疫苗種類/對象		幼兒 6m-5歲	兒童 5-11歲			青少年 12-17歲				成人 18歲以上				
	劑次	莫德納：第1、2劑 BNT：第1、2、3基礎劑 (不建議混打)	第1、2劑 (不建議混打)	基礎加強劑 (以BNT完成 基礎劑者)	第3劑 (追一)	第1、2劑 (以同製程疫苗 完成施打)	基礎加 強劑	第3劑 (追一)	第4劑 (追二)	第1、2劑	基礎加 強劑	第3劑 (追一)	第4劑 (追二)	第5劑 (追三)
疫苗 種類	莫德納BA.1 雙價疫苗 (12歲以上)	-	-	-	-	-	-	V	V	-	-	V	V	V
	幼兒莫德納 (6m-5歲)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	幼兒BNT (6m-4歲)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	兒童BNT (5-11歲)	-	V	V	尚未執行	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	莫德納 (6歲以上)	-	V (半劑量)	-	尚未執行	V	V	-	-	V	V	V (半劑量)	V (半劑量)	V (半劑量)
	BNT (12歲以上)	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Novavax (12歲以上)	-	-	-	-	V	-	V	V	V	V	V	V	V
	高端 (20歲以上)	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V
	AZ(國內已無庫存) (18歲以上)	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V (不建議)	V (不建議)	-	-
	間隔時間	莫德納：4-8週 BNT：第1、2劑4週， 第2、3劑8週	4-8週	4週 (28天)	12週 (84天)	mRNA疫苗：12週 Novavax：4週	4週 (28天)	12週 (84天)	12週 (84天)	AZ：8週 其他：4週	4週 (28天)	12週 (84天)	12週 (84天)	12週 (84天)

註：追一(第一次追加劑)、追二(第二次追加劑)、追三(第三次追加劑)